

## Mirvaso® (brimonidine) 0.33% gel 使用衛教單

### 一、適用對象

1. 此為凝膠型藥物，於 2013 由美國糧食與藥物管理局(FDA)核准上市，目前也已取得台灣藥證，預計於明後年上市；目前成大醫院可經醫師評估後以專案申請的方式使用藥物。
2. Mirvaso 適用於成人病患，作為玫瑰斑(酒糟鼻)臉部紅斑的症狀治療。

### 二、原理及用法

1. 每天僅塗抹一次，Mirvaso 會迅速(通常 1 小時左右)使臉部紅斑減輕或消退，一般可持續 12 時，所以建議早上出門前使用。請先擦完其他保養品後，再擦 Mirvaso。
2. 藥膏為自費使用，一條藥膏可使用 2-3 個月，取約豌豆大小或更少份量的藥品就夠塗薄薄的一層在臉部有潮紅的皮膚；可依需求做調整。塗抹此藥品後應立即洗手，且勿塗到眼睛。
3. 此藥品為  $\alpha_2$  促進劑，使用於皮膚上可使皮膚的血管收縮，達到退紅的效果。

### 三、副作用及注意事項

1. 大約 10% 病人使用後覺得不適用。常見副作用為紅斑、搔癢症、潮紅及皮膚灼熱感(各約 1.2 至 3.3%)，少數有過敏現象，若塗完有乾燥及搔癢狀況可多擦乳液。若塗後或藥效過後有異常潮紅或灼熱感，請先停用並回門診與醫師討論用藥狀況。
2. 由於 Mirvaso 治療效果是幫助臉部紅斑消退，玫瑰斑患者的肌膚仍然相當脆弱，所以擦了藥仍然是需要防曬及避免誘發因子。
3. 其他全身性不良反應相當少見，但患有患有憂鬱症、腦或冠狀動脈供血不足、雷諾氏現象、姿勢性低血壓、血栓閉塞性脈管炎、硬皮症或修格蘭氏症候群(Sjögren's syndrome)，使用上須特別注意。



來源：

成大醫院皮膚部 2015.10; Mirvaso® 仿單 <http://mirvaso.com/using-mirvaso-gel>

製作單位：成醫皮膚部

製作日期：105/05/24