

成大醫院 貼膚試驗注意事項

貼膚測試

貼膚試驗(patch test)為診斷過敏性接觸性皮膚炎以及尋找皮膚過敏原的重要方法。如果醫師懷疑你可能因為化妝品、外用藥劑、工作中接觸的化學品或水泥等過敏時，為了診斷及治療的需要，會建議做貼膚試驗。

做此試驗，病人必須連續來門診三次。第一次我們在病患背部貼上可能的過敏原，然後病患遵照與醫師之約定，於 48(2 天)及 72(3 天)小時回門診觀察皮膚反應，以便找出致病原因。

為了得到正確的檢驗結果，請病患配合下列事項：

貼膚試驗固定於禮拜一、二執行，於禮拜三至五判讀。

1. 貼膚試驗前，請病患提供詳細的病史，包括皮膚可能接觸過的過敏原，以供醫師參考。
2. 請將自己身邊或工作環境中可能接觸的過敏原，如化妝品、化學品、農藥等帶來供醫師參考，以決定是否用來做貼膚試驗。
3. 貼膚試劑貼在背上時，請勿從事易出汗的活動。
4. 盡量避免暴露或接觸到過敏原，例如懷疑對水泥過敏者避免接觸水泥，懷疑對光過敏者避免日曬。
5. 若貼膚試驗處有輕微癢感，請勿搔抓，最多只能輕拍止癢
6. 萬一貼膚試驗處嚴重癢感，或原來的皮膚病嚴重惡化，請回門診，我們將為您做進一步處理。
7. 上了貼膚膠布 48 小時以後，請依醫師指示回門診，或經醫師指示自行撕下貼膚膠布。切記不能清洗或擦拭背部，一直到貼膚試驗的第 72 小時回門診給醫師判讀過後，方可清洗背部。
8. 撕下膠布後，會需要以油性筆在背後做記號，以便對照可能過敏物質的相關位置，在 72 小時判讀完成之前，切勿清洗。
9. 醫師判讀後，會將結果及以後應避免的物品、藥劑等告知病人，病人應盡量避免再接觸這些成分，以減少過敏性皮膚炎再發。
10. 請勿自行服用口服類固醇，或於背上擦藥膏。

成大醫院皮膚科 貼膚測試

病患姓名		主治醫師	
病歷號		受試日期	
貼膚時間		判定時間(48hr)	
判定時間(72hr)			

European baseline series S-1000			48hrs	72hrs
1	Potassium dichromate	0.5% pet		
2	p-phenylenediamine (PPD)	1.0% pet		
3	Thiuram mix	1.0% pet		
4	Neomycin sulfate	20% pet		
5	Cobalt(II) chloride hexahydrate	1.0% pet		
6	Caine mix III	10% pet		
7	Nickel(II) sulfate hexahydrate	5% pet		
8	2-Hydroxyethyl methacrylate	2% pet		
9	Colophonium	20% pet		
10	Paraben mix	16% pet		
11	N-Isopropyl-N-phenyl-4-phenylenediamine (IPPD)	0.1% pet		
12	Lanolin alcohol	30% pet		
13	Mercapto mix	2.0% pet		
14	Epoxy resin, Bisphenol A	1.0% pet		
15	Peru balsam	25% pet		
16	4-tert-Butylphenolformaldehyde (PTBP)	1.0% pet		
17	2-Mercaptobenzothiazole (MBT)	2.0% pet		
18	Formaldehyde	2.0% aq		
19	Fragrance mix I	8.0% pet		
20	Sesquiterpene lactone mix	0.1% pet		
21	Quaterium-15	1.0% pet		
22	Propolis	10% pet		
23	Methylisothiazolinone + methylchlorisothiazolinone	0.02% aq		
24	Budesonide	0.01% pet		
25	Tixocortol-21-pivalate	0.1% pet		
26	Methyldibromo glutaronitrile	0.5% pet		
27	Fragrance mix II	14.0% pet		
28	Hydroxyisohexyl-3-cyclohexene carboxaldehyde	5.0% pet		
29	Methylisothiazolinone	0.2% aq		
30	Texile dye mix	6.6% pet		
31	自備物品			
32	自備物品			

成大醫院 藥物貼膚測試

病患姓名		主治醫師	
病歷號		受試日期	
藥物疹類別	<input type="checkbox"/> 斑性丘狀發疹 (maculopapular eruption) <input type="checkbox"/> 固定型藥物疹 (fixed drug eruption) <input type="checkbox"/> 急性廣泛性發疹性膿疱症 (Acute generalized exanthematous pustulosis, AGEP) <input type="checkbox"/> 全身性接觸性皮膚炎 (Systemic contact dermatitis) <input type="checkbox"/> 藥物疹合併嗜伊紅血症及全身症狀 (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) <input type="checkbox"/> 史蒂芬-強生症候群/毒性表皮壞死症後群 (Stevens-Johnson syndrome/Toxic epidermal necrolysis) <input type="checkbox"/> 其他: _____		
藥物疹病史	發疹日期		
	是否使用系統性類固醇治療		
	結束系統性類固醇治療		
	皮膚切片診斷		

			yy/mm	yy/mm	
	懷疑藥物	配製濃度/ 基質	48hrs	72hrs	Delay reading
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

成大醫院 光貼膚測試

病患姓名		主治醫師	
病歷號		受試日期	
最低致紅劑量 MED		UVA	UVB
	24hr (yyyy/mm/dd)		
	48hr (yyyy/mm/dd)		
光貼膚測試		光源使用	

		yy/mm	yy/mm	yy/mm	
	過敏原	48hrs (照光前) (第一次判讀) -/+ irradiance	96hrs (第二次判讀) -/+ irradiance	延遲判讀時間	結果判定 Nil/ACD/PACD
1		/	/	/	
2		/	/	/	
3		/	/	/	
4		/	/	/	
5		/	/	/	
6		/	/	/	
7		/	/	/	
8		/	/	/	
9		/	/	/	
10		/	/	/	
11		/	/	/	
12		/	/	/	
13		/	/	/	
14		/	/	/	
15		/	/	/	
16		/	/	/	
17		/	/	/	
18		/	/	/	
19		/	/	/	
20		/	/	/	