

術後傷口護理


準備用物

- (一) 生理食鹽水(以單次小瓶包裝為佳，開封24小時後就不建議再使用)
- (二) 無菌棉棒和適當尺寸的無菌紗布
- (三) 紙膠(皮膚脆弱或易過敏者，建議使用矽膠減敏膠帶或嬰幼兒專用膠帶)

步驟

1. 換藥前換藥者需先以肥皂清洗雙手。
2. 以手指將皮膚繃緊，慢慢撕除膠帶及紗布，若紗布已沾黏傷口，切勿用力撕下，
可用生理食鹽水先充分潤濕紗布及傷口後，再慢慢取下紗布。

3. 傷口消毒	4. 抗生素藥膏	5. 傷口包紮	6. 避免沾溼
無菌棉棒沾生理食鹽水除去傷口上的血漬或藥膏。	薄塗門診開立之抗生素藥膏。	用新紗布與透氣膠帶包覆傷口。	洗澡時可以使用合適的傷口防水透氣敷料。 洗完澡後須更換為無菌紗布。



7. 傷口每日換藥一次。若傷口滲液較多或不慎弄濕，就應立即再重新換藥。

注意事項

1. 請依醫師預約的時間回診看病理報告及拆線。
2. 手術後乾淨的傷口:未癒合前請儘量保持傷口乾燥約7-10天，尤其是手術後前3天需特別觀察傷口是否有持續出血、紅腫熱痛、異味或黃綠色分泌物等，如有上述現象，可於星期一~五 09:00-17:00撥打06-2353535轉2287 門診皮膚科治療室詢問。